ОБЗОР ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД В ЛИНИИ ОДНОКРАТНО ДЕЙТЕРИРОВАННОГО АММИАКА NH₂D

© 2024 г. Е. А. Трофимова^{1,*}, И. И. Зинченко^{1,**},
П. М. Землянуха^{1,***}, М. Томассон^{2,****}

¹Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики
им. А. В. Гапонова-Грехова Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия

²Чалмерский технологический университет, Обсерватория Онсала, Швеция

*E-mail: tea@ipfran.ru

**E-mail: zin@ipfran.ru

***E-mail: petez@ipfran.ru

****E-mail: magnus.thomasson@chalmers.se

Поступила в редакцию 24.03.2024 г.

После доработки 04.06.2024 г.

Принята в печать 04.06.2024 г.

Настоящий обзор является продолжением исследования областей образования массивных звезд в линиях дейтерированных молекул, первые результаты которого были опубликованы в работе [1]. В настоящей работе представлены результаты наблюдений 50 объектов в линии орто модификации однократно дейтерированного аммиака NH₂D $1_{11}^s - 1_{01}^s$ на частоте 85.9 ГГц, выполненных при помощи 20-метрового радиотелескопа Обсерватории Онсала (Швеция). Линия зарегистрирована в 29 источниках. Анализ полученных данных, а также тот факт, что концентрация газа в исследуемых источниках по независимым оценкам значительно ниже критической концентрации для данного перехода NH₂D, указывают на не-ЛТР возбуждение NH₂D. На основе не-ЛТР моделирования получены оценки относительного содержания молекулы NH₂D, степени обогащения дейтерием, и проанализированы зависимости этих параметров от температуры и дисперсии скоростей с учетом и без учета верхних пределов обнаружения в предположении одинаковой концентрации газа во всех источниках. Выявлена антикорреляция между относительным содержанием NH₂D и кинетической температурой газа в интервале температур 15–50 К. При этом значительного уменьшения отношения содержаний NH₂D/NH₃ с ростом температуры, предсказываемого имеющимися химическими моделями, при используемых предположениях не наблюдается. Выявлена также антикорреляция между относительным содержанием основного изотопа аммиака NH₃ и дисперсией скоростей, в то время, как статистически значимой корреляции с кинетической температурой источников в этом же интервале температур не обнаружено.

Ключевые слова: звездообразование, межзвездная среда, молекулярные облака, межзвездные молекулы, радиолинии, астрохимия

DOI: 10.31857/S0004629924080027 EDN: ITNXRD

1. ВВЕДЕНИЕ

Эффект фракционирования дейтерия в межзвездных облаках обусловлен экзотермичностью реакций замены протона дейтроном в молекулах (прежде всего H₃⁺), которые лежат в основе цепочек химических реакций, ведущих к образованию большинства других молекул (см., напр., [2]). Помимо этого, важную роль в данном эффекте играют вымораживание на пылинках при низких температурах таких молекул, как CO, которые разрушаются также уменьшение при этом степени ионизации газа, что снижает скорость рекомбинации H₂D⁺. Этот эффект

наиболее заметен, и активно изучался прежде всего в темных холодных облаках, но в последнее время появился ряд работ по его изучению в областях образования массивных звезд (см., напр., [3, 4, 5, 6, 7]). А также недавно вышел обзор массивных сгустков из обзора ATLASGAL в линиях дейтерированного аммиака [8].

Нами в 2017–2018 гг. был выполнен обзор нескольких десятков областей образования массивных звезд в линиях ряда дейтерированных молекул в диапазоне длин волн 3–4 мм на 20-метровом радиотелескопе Обсерватории Онсала. Результаты

наблюдений DCN, DNC, DCO⁺ и N₂D⁺ были опубликованы в работе [1]. В настоящей работе мы приводим результаты обзора в линии орто модификации однократно дейтерированного аммиака NH₂D. Результаты сопоставлены с имеющимися химическими моделями. Наиболее детальная модель дейтерирования аммиака представлена в работе [9]. В разделе 2 приведена выборка наблюдавшихся источников, а также описаны процедуры наблюдений и обработки данных. В разделе 3 представлены результаты наблюдений и оценки содержания молекул. В разделе 4 дан анализ полученных результатов.

2. НАБЛЮДЕНИЯ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Наблюдения, которые анализируются в данной работе, были описаны в статье [1]. Ниже кратко изложены основные параметры этих наблюдений. Всего были исследованы 50 объектов. Эти источники были отобраны по наличию признаков образования

массивных звезд и ранее наблюдались нами в других линиях [1]. Список объектов с их координатами и альтернативными названиями представлен в табл. 1. Наблюдения этих источников проводились в 2017–2018 гг. на 20-метровом радиотелескопе обсерватории Онсала (Onsala Space Observatory, Швеция). Линия орто-NH₂D 1₁₁^s – 1₀₁^a (в дальнейшем используется обозначение 1₁₁ – 1₀₁) на частоте 85.926278 ГГц попадает в одну из наблюдавшихся частотных полос. В табл. 1 приведены лишь те объекты, которые наблюдались в этой полосе. Для некоторых из них были получены карты в линии NH₂D, которые здесь не обсуждаются. В наблюдавшихся позициях в источниках Per4, G202.99+2.11 и NGC 2264 не зарегистрировано ни линии NH₂D, ни других линий, которые можно было бы использовать для оценки пределов обнаружения NH₂D. Поэтому эти источники не используются в дальнейшем анализе и отсутствуют в последующих таблицах.

Таблица 1. Список источников

Источник	RA(J2000)	Dec(J2000)	V _{LSR} , км/с	D, кпк	R _g , кпк	Примечания
G121.30+0.66	h m s 00:36:47.50	° ' " +63:29:02.1	–17.7	0.85	9.0	IRAS00338+6312
S184	00:52:25.15	+56:33:53.3	–30.4	2.1	9.8	G123.07–6.31, IRAS00494+5617
S187(N ₂ H ⁺)	01:23:15.38	+61:49:43.1	–14.0	3	10.6	G126.68–0.81, IRAS01194+6136
G133.69+1.22	02:25:28.23	+62:06:57.7	–43.1	2.3	10.2	
G133.71+1.22	02:25:40.56	+62:05:53.2	–38.9	2.3	10.2	IRAS02219+6152, AFGL326
G133.75+1.20	02:25:53.50	+62:04:10.7	–38.9	2.3	10.2	
G133.95+1.07	02:27:04.68	+61:52:25.5	–47.7	2.3	10.2	IRAS02232+6138, AFGL3314
S199	02:57:35.60	+60:17:22.0	–38.0	2.1	10.1	IRAS02575+6017, AFGL4029
S201	03:03:17.90	+60:27:52.0	–37.0	2.1	10.2	G138.5+1.6, IRAS02593+6016
AFGL490	03:27:31.51	+58:44:28.8	–12.0	0.35	8.8	IRAS03236+5836
G142.00+1.83	03:27:38.77	+58:47:00.1	–13.9	0.35	8.8	V _{LSR} из [10]
Per4	03:29:18.00	+31:27:31.0	7.6	0.35	8.8	G158.27–20.37
G170.66–0.27	05:20:16.14	+36:37:21.1	–18.8			IRAS05168+3634
G174.20–0.08	05:30:45.62	+33:47:51.6	–3.5	1.8	10.3	AFGL5142, IRAS05274+3
G173.17+2.35	05:37:57.85	+35:58:40.5	–19.5	2.3	10.8	IRAS05345+3556
S231	05:39:12.90	+35:45:54.0	–16.6	2.3	10.8	G173.48+2.45, IRAS05358+3543
G173.58+2.44	05:39:27.94	+35:40:41.4	–16.0	2.3	10.8	IRAS05361+3539

Таблица 1. Продолжение

Источник	RA(J2000)	Dec(J2000)	V_{LSR} , км/с	D , кпк	R_g , кпк	Примечания
S235	h m s 05:40:53.32	° ' " +35:41:48.7	-17.0	2.3	10.8	G173.72+2.70, IRAS05375+3540
G205.11-14.11	05:47:05.45	+00:21:50.0	9.8	0.5	9.0	AFGL818, NGC2071, IRAS05445+0016
G189.78+0.35	06:08:35.41	+20:39:02.9	9.1	1.5	10.0	
AFGL6366	06:08:41.00	+21:31:01.0	3.0	1.5	10.0	G189.03+0.78, IRAS06056+2131
S247	06:08:53.94	+21:38:36.6	3.3	2	10.5	G188.95+0.89, IRAS06058+2138
S255N	06:12:53.64	+18:00:26.8	7.1	2.5	11.0	G192.58-0.04
S255IR	06:12:54.00	+17:59:23.1	7.1	2.5	11.0	G192.60-0.05
G202.99+2.11	06:40:44.59	+09:48:12.6	18.0	0.8	9.2	
NGC2264	06:40:58.00	+09:53:42.0	18.0	0.8	9.2	G202.94+2.19
W217	06:41:10.96	+09:29:31.8	18.0	0.8	9.2	IRAS06384+0932, AFGL989
W40	18:31:15.75	-02:06:49.3	5.0	0.5	8.1	
G58.47+0.43	19:38:58.12	+22:46:32.2	37.3			IRAS19368+2239
S100	20:01:45.59	+33:32:41.1	-23.8			G70.29+1.60, IRAS19598+3324
G65.78-2.61	20:07:06.74	+27:28:52.9	8.0			IRAS20050+2720
G69.54-0.98	20:10:09.13	+31:31:37.3	11.8	1.4	8.1	IRAS20081+3122
G77.46+1.76	20:20:38.54	+39:38:18.9	3.1	4	8.6	IRAS20188+3928, JC20188+3928
G75.78-0.34	20:21:43.89	+37:26:38.6	-0.4	0.5	8.4	
G79.27+0.39	20:31:57.50	+40:18:30.0	1.2	1	8.4	
G79.34+0.33	20:32:21.80	+40:20:08.0	0.0	1	8.4	
W75N	20:38:36.93	+42:37:37.0	10.7	1.7	8.4	G81.87+0.78
W75(OH)	20:39:00.60	+42:22:48.8	-3.8	3	8.6	G81.72+0.57
W75S3	20:39:03.43	+42:25:53.0	2.1	3	8.6	G81.77+0.60
G81.50+0.14	20:40:08.30	+41:56:26.0	-4.5	1.3	8.4	
G92.67+3.07	21:09:21.74	+52:22:37.6	-15.2			
G99.98+4.17	21:40:42.36	+58:16:09.7	1.8	0.75	8.7	IRAS21391+5802, L1121
S140	22:19:18.20	+63:18:51.2	-7.0	0.91	8.8	G106.80+5.31
G109.87+2.11	22:56:18.10	+62:01:49.4	-7.0			
G108.76-0.95	22:58:42.71	+58:47:09.2	-50.4	3.5	10.2	JC22566+5830
S153	22:58:47.66	+58:45:00.7	-51.0	4.3	10.7	G108.76-0.99, IRAS22566+5828
S152(OH)	22:58:49.60	+58:45:15.3	-52.7	3.5	10.2	G108.77-0.98
S156	23:05:09.90	+60:14:31.0	-50.6	3.5	10.3	G110.11+0.04
G111.54+0.78	23:13:44.72	+61:28:09.7	-57.6	3.5	10.3	IRAS23116+6111, NGC7538
S158	23:13:44.84	+61:26:50.7	-55.5	3.5	10.3	G111.53+0.76

Молекула NH_2D является асимметричным волчком. Переходы этой молекулы испытывают сверхтонкое расщепление, обусловленное квадрупольным моментом как ядра азота N, так и ядра дейтерия D. Последнее, однако, очень мало и обычно не разрешается в астрономических наблюдениях [11]. Сверхтонкая структура наблюдавшегося перехода, обусловленная ядром азота, содержит шесть компонентов, но два центральных компонента в наших наблюдениях сливаются, поскольку интервал между ними составляет всего лишь 0.16 км/с [12, 13].

Обработка полученных спектров NH_2D проводилась путем их аппроксимации с помощью метода HFS в программе CLASS, которая является частью пакета GILDAS, разработанного в Институте миллиметровой радиоастрономии¹. Оценка лучевых концентраций молекул выполнялась с помощью оффлайн версии программы RADEX² [14]. Оценка коэффициентов корреляции и линейной регрессии с учетом пределов обнаружения выполнялась при помощи программы ASURV Rev. 1.2 [15, 16], а без пределов — с использованием стандартных подпрограмм из Numerical Recipes [17]. Для определения частот переходов и сверхтонких компонентов использовались базы данных SPLATOLOGUE³ и NIST⁴.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Результаты наблюдений

Линии NH_2D были обнаружены в 29 источниках. На рис. 1 показаны спектры всех источников, где данная линия была зарегистрирована. На рис. 2 представлены спектры тех источников, где эта линия не была зарегистрирована. В результате обработки данных были определены параметры линии $1_{11} - 1_{01}$ NH_2D (скорость, ширина линии и интенсивность), которые приведены в табл. 2. Интенсивности линий представлены в шкале яркостных температур в основном лепестке диаграммы направленности. Также в табл. 2 приведены значения верхних пределов интенсивностей линий NH_2D для источников, где они не были зарегистрированы. Верхним пределом интенсивности линии NH_2D считалась величина $3\sigma/\sqrt{N}$, где σ — среднеквадратичная величина шумов в каналах, а N — количество спектральных каналов, которое определяется как отношение ширины линии для предела к ширине спектрального канала. В качестве ширины линий для пределов брались сред-

ние ширины узких линий в источнике таких молекул, как H_2CO , HC_3N и H^{13}CN . Сравнение ширины узких линий ($\langle\Delta V\rangle$) в источнике и ширины линии NH_2D показывает, что в среднем отношение $\langle\Delta V\rangle/\Delta V(\text{NH}_2\text{D})$ составляет примерно 1.52 (рис. 3). Это означает, что оценки верхних пределов интенсивностей линий NH_2D могут быть занижены на $\sim 25\%$. Тогда оценки верхних пределов интегральной интенсивности линии, которые используются для расчета лучевых концентраций, будут завышены на такой же фактор, что не является принципиальным.

В последнем столбце табл. 2 приведены оценки оптической толщины в линии, полученные в программе CLASS из отношений интенсивностей компонентов сверхтонкой структуры линии методом HFS. Эта величина представляет собой сумму оптических толщин по всем компонентам. Оптическая толщина центрального компонента составляет 1/2 от этой величины. Для случаев, когда величина оптической толщины слишком мала и не может быть определена, в табл. 2 указаны верхние пределы, представляющие собой утроенные значения погрешности определения оптической толщины. Надо отметить, что в документации GILDAS в качестве одного из предположений для метода HFS указывается отсутствие перекрытий компонентов сверхтонкого расщепления. Для наших источников это условие в большинстве случаев не выполняется, как можно видеть на рис. 1. Однако анализ документации GILDAS показывает, что данное предположение не является обязательным. Для проверки мы оценили оптические толщины для некоторых источников, используя подход, описанный в работе [18]. Результаты получились близкими.

3.2. Оценки лучевых концентраций NH_2D

Для оценок лучевых концентраций молекул NH_2D и определения степени обогащения дейтерием в исследуемых источниках необходимо знать кинетическую температуру газа в этих областях. Температуры ряда источников были взяты для расчетов из публикаций [19–27], главным инструментом оценки которых является основной изотоп аммиака NH_3 . Температуры части наблюдавшихся объектов были определены по вращательным диаграммам молекулы типа симметричного волчка CH_3CSH , линии которой видны в данных объектах. Эта молекула является хорошим индикатором температуры достаточно плотного газа [19]. Температуры, полученные этим методом, взяты из нашей предыдущей публикации [1]. Недавно была опубликована работа, в которой проводились сравнения методов оценки

¹ <http://www.iram.fr/IRAMFR/GILDAS>

² <http://var.sron.nl/radex/radex.php>

³ <http://www.cv.nrao.edu/php/splat/>

⁴ <https://physics.nist.gov/cgi-bin/micro/table5/start.pl>

Рис. 1. Спектры источников с зарегистрированными линиями NH_2D . Верхняя шкала на рисунках показывает V_{LSR} в км/с.

Рис. 1. Продолжение.

Рис. 1. Продолжение.

Рис. 1. Окончание.

температуры по линиям основного изотопа аммиака NH_3 и по линиям метилацетилена CH_3CCH [28]. Результаты данного исследования показали хорошую согласованность результатов оценок по обоим методам. Для источников, температуры которых неизвестны и не было обнаружено линий молекул, по которым можно определить температуру объектов, кинетические температуры газа были приняты равными 20 К. Всего таких источников 9: 4 источника с зарегистрированными линиями NH_2D и 5 источников, где линия NH_2D обнаружена не была. Это

соответствует типичной температуре пыли для части источников нашей выборки [28]. Кинетические температуры газа наблюдавшихся объектов, использованные для расчетов, приведены в табл. 3.

Лучевые концентрации молекул орто- NH_2D оценивались в не-ЛТР модели с помощью оффлайн версии программы RADEX по полученным в результате обработки спектров параметрам линий, приведенным в табл. 2. Были рассмотрены различные концентрации газа от $1 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$ до $1 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$. Этот диапазон концентраций соответствует оценкам, полученным для части источников из этой выборки по наблюдениям двух переходов молекул DCN , DNC и DCO^+ [18]. Необходимость использования не-ЛТР модели обусловлена следующими факторами. Для того, чтобы согласовать оценки оптической толщины в линиях с измеренными значениями антенной температуры, есть несколько возможностей. Во-первых, можно предположить, что кинетическая температура газа в областях излучения NH_2D очень мала, всего несколько градусов. Такое предположение выглядит совершенно нереальным, поскольку непонятно, как могут появиться такие области в этих источниках. Во-вторых, можно предположить, что очень мал фактор заполнения диаграммы направленности

Рис. 2. Спектры источников, где линии NH_2D не были зарегистрированы. Верхняя шкала на рисунках показывает V_{LSR} в км/с.

Рис. 2. Продолжение.

Рис. 2. Окончание.

антенны излучением источника. Но это предположение не согласуется с данными о размерах источников [31, 18]. В принципе, низкий фактор заполнения может быть связан с возможной неоднородной структурой источников. Однако, имеющиеся данные о мелкомасштабных неоднородностях в таких источниках (см., напр., [32, 33]) не согласуются с требуемым очень низким значением фактора заполнения. Остается предположить, что температура возбуждения данного перехода много меньше кинетической температуры газа, что и делает необхо-

димым использование не-ЛТР моделирования. Надо также отметить, что критическая концентрация газа (при которой сравниваются скорости радиационных и столкновительных переходов [34]) для данного перехода NH_2D весьма высока, $\sim 4 \times 10^6 \text{ см}^{-3}$ при температурах 5–20 К по данным работы [35]. Для более горячих источников с кинетическими температурами газа $T_k \sim 40 \text{ К}$ критическая концентрация газа снижается и приближается к отметке $\sim 1 \times 10^6 \text{ см}^{-3}$. Эти величины заметно превышают приведенные выше оценки концентрации газа в таких источниках, что также указывает на необходимость не-ЛТР моделирования. Оценки лучевых концентраций NH_2D , полученные для критической концентрации, приняты в качестве нижнего предела этих величин и приведены в табл. 3. Как показано в работе [1], именно при концентрациях газа близких к критической получают минимальные оценки лучевых концентраций.

Однако вывод о не-ЛТР возбуждении NH_2D может поставить под сомнение оценки оптической толщи в данной линии, поскольку они основаны на предположении о равенстве температур возбуждения компонентов сверхтонкого расщепления. По нашему мнению, для этих сомнений нет оснований. Для равенства этих температур возбуждения ЛТР в прин-

Таблица 2. Параметры зарегистрированных линий однократно дейтерированного аммиака NH₂D

Источник	V , км/с	T_{mb} , мК	ΔV , км/с	τ
G121.30+0.66	-17.50(05)	308(18)	1.99(12)	1.20(54)
S184	-29.80(18)	168(43)	2.15(54)	1.72(1.79)
S187(N ₂ H ⁺)	-13.30(04)	225(21)	0.88(08)	1.82(98)
G133.69+1.22		<81	4.98(28)	
G133.71+1.22		<85	3.29(20)	
G133.75+1.20		<119	2.82(1.31)	
G133.95+1.07		<82	4.40(72)	
S199	-37.90(13)	158(27)	1.26(21)	0.83(2.17)
S201		<38	2.96(27)	
AFGL490	-12.20(03)	335(24)	0.84(06)	2.35(83)
G142.00+1.83		<89	2.02(50)	
G170.66-0.27		<78	1.52(14)	
G174.20-0.08	-3.77(09)	344(69)	1.16(23)	0.67(2.26)
G173.17+2.35		<55	2.12(81)	
S231	-16.40(12)	149(28)	2.17(41)	1.00(1.29)
G173.58+2.44	-16.40(03)	254(13)	1.1(06)	2.39(68)
S235		<74	2.23(31)	
G205.11-14.11	9.49(06)	254(29)	1.00(12)	4.57(1.71)
G189.78+0.35	8.75(30)	117(19)	2.55(41)	0.47(2.75)
AFGL6366	3.83(10)	149(47)	0.75(24)	<14.00
S247		<46	3.05(39)	
S255N		<58	3.07(18)	
S255IR		<148	2.25(37)	
W217	7.49(13)	427(77)	2.21(40)	2.14(1.31)
W40	4.76(01)	1231(38)	0.64(02)	3.80(41)
G58.47+0.43	36.50(26)	144(32)	1.83(40)	<9.00
S100		<88	5.99(30)	
G65.78-2.61	6.41(30)	195(64)	2.80(92)	1.75(2.48)
G69.54-0.98	10.90(23)	222(48)	2.52(54)	2.78(1.85)
G77.46+1.76	1.72(05)	667(33)	1.99(10)	2.38(50)
G75.78-0.34		<28	3.88(53)	
G79.27+0.39	1.86(09)	443(49)	1.38(15)	4.37(1.56)
G79.34+0.33	0.26(08)	436(58)	1.26(17)	1.24(1.42)
W75N	8.30(02)	134(36)	2.88(78)	0.82(1.71)
W75(OH) line 1	-3.84(27)	302(192)	1.39(89)	1.12(10)
W75(OH) line 2	-2.58(27)	140(25)	5.02(89)	0.52(10)
W75S3	-4.32(01)	964(12)	1.59(02)	2.84(14)
G81.50+0.14		<68	1.18(73)	
G92.67+3.07		<53	2.32(37)	
G99.98+4.17	0.43(32)	97(26)	2.05(56)	5.02(3.25)

S140	-7.51(25)	59(10)	2.32(38)	<2.50
G109.87+2.11		<106	3.81(65)	
G108.76-0.95	-50.80(09)	241(19)	1.88(15)	<2.50
S153	-51.90(21)	338(92)	1.76(48)	5.06(2.18)
S152(OH)	-51.30(05)	584(35)	1.56(09)	2.96(66)
S156		<193	5.21(40)	
G111.54+0.78	-56.30(09)	28(8)	3.76(1.07)	1.63(0.28)
S158	-55.30(36)	125(36)	4.19(1.19)	0.36(3.21)

Примечание. В скобках приведены среднеквадратичные погрешности последних знаков. Для источников, не зарегистрированных в данных линиях, использовались средние ширины других узких линий, обнаруженных в конкретном источнике (см. раздел 3).

ципе не требуется. Действительно, есть хорошо известные случаи «аномалий» сверхтонкой структуры, когда температуры возбуждения компонентов сильно различаются, например, в переходах $J=1-0$ HCN и (1,1) NH₃. Они объясняются некоторыми особенностями структуры энергетических уровней этих молекул и перекрытиями компонентов [36, 37, 38, 39]. В случае NH₃ эти аномалии не препятствуют оценкам оптической толщи. Для NH₂D аномалии не известны, так что оценки оптической толщи представляются надежными.

Рис. 3. Сравнение ширины линии однократно дейтерированного аммиака NH₂D и средней ширины узких линий в источнике $\langle \Delta V \rangle$. Сплошная линия соответствует $\langle \Delta V \rangle = \Delta V(\text{NH}_2\text{D})$, штриховая — $\langle \Delta V \rangle = 1.52\Delta V(\text{NH}_2\text{D})$.

Надо отметить, что при моделировании излучения NH₂D в RADEX не учитывается сверхтонкое расщепление данного перехода. Это может привести к ошибкам в оценках лучевой концентрации. В качестве входных параметров мы задаем яркостную температуру центрального компонента и ширину линии. Поскольку сателлиты при этом, вероятно, не учитываются, полученная оценка лучевой концентрации может быть занижена примерно в 2 раза. Для проверки этого предположения мы сравнили ЛТР оценки лучевых концентраций, полученные по известным формулам (см., напр., [40]), с оценками в программе RADEX для очень высоких концентраций газа ($n = 10^9 \text{ см}^{-3}$), при которых должны выполняться условия ЛТР. Оказалось, что оценки RADEX, действительно, примерно в 2 раза ниже. Поэтому все оценки лучевых концентраций, полученные при моделировании в RADEX, были увеличены в 2 раза.

Для дальнейших оценок полного содержания NH₂D рассчитанные лучевые концентрации орто-NH₂D были умножены на коэффициент 1.33, что соответствует отношению содержаний орто- и пара-NH₂D равному 3 из спиновой статистики [41]. Это значение хорошо согласуется с данными наблюдений. Наиболее строгий анализ данных наблюдений с учетом оптической толщи в линиях дает для отношения лучевых концентраций значение 3.7 ± 1.2 [8] (для массивных сгустков из обзора ATLASGAL). Более простые оценки по отношению интегральных интенсивностей линий орто и пара-NH₂D дали величины 2.6 ± 0.6 [42], 2.6 ± 0.8 [8], 2.6 ± 0.7 [18]. Более низкие значения по сравнению с отношением лучевых концентраций, скорее всего, объясняются более высокой оптической толщиной в линиях орто-NH₂D по сравнению с линиями пара-NH₂D. Значения полных лучевых концентраций для молекулы

однократно дейтерированного аммиака NH_2D с учетом поправки на пара- NH_2D приведены в табл. 3. Для нескольких наблюдавшихся объектов не была найдена информация о лучевых концентрациях аммиака NH_3 , поэтому эти объекты не учитываются в настоящем исследовании.

В источнике W75(OH) были обнаружены 2 линии NH_2D с разными скоростями. Каждая из этих линий была обработана отдельно и данные, полученные в результате обработки, представлены для каждой линии отдельной строкой в табл. 2 и 3. Для дальнейших исследований была выбрана линия со скоростью — 3.84 км/с как более интенсивная и соответствующая основному компоненту источника (см., напр., [18]).

Верхние пределы лучевых концентраций NH_2D рассчитывались так же, как и лучевые концентрации для зарегистрированных источников, только с использованием верхних пределов интенсивностей линии NH_2D и средних ширин узких линий молекул, обнаруженных в конкретном источнике, как описано выше. Поскольку эти средние ширины несколько больше ширин линии NH_2D (см. рис. 3), оценки верхних пределов лучевых концентраций NH_2D могут быть завышены на $\sim 25\%$, что не является принципиальным. В источнике G81.50+0.14 не было обнаружено узких линий, поэтому в качестве ширины линии использовалось среднее значение ширин линий переходов (1,1) и (2,2) молекулы аммиака NH_3 , взятые из работы [25]. Кинетические температуры источников, использовавшиеся для расчетов пределов обнаружения однократно дейтерированного аммиака, указаны в табл. 3.

При моделировании измеренных спектров с помощью RADEX получаются и модельные значения оптической толщины в линиях. При предполагаемой концентрации газа от $1 \times 10^4 \text{ см}^{-3}$ до $1 \times 10^6 \text{ см}^{-3}$ эти модельные значения оказываются значительно ниже оценок оптической толщины в табл. 2. Для того, чтобы согласовать модельные оптические толщины с измеренными, есть несколько возможностей. Во-первых, можно предположить более низкую концентрацию газа. Требуемая для этого величина $n \sim 3 \times 10^3 \text{ см}^{-3}$. Она по крайней мере в 3 раза ниже упомянутых выше оценок концентрации газа в таких источниках. Оценки по наблюдениям аммиака обычно так же дают более высокие значения. Однако области, которые вносят основной вклад в излучение NH_2D и NH_3 , вполне могут быть разными. Надо отметить, что погрешности оценок оптической толщины по данным наблюдений в большинстве случаев весьма велики, что не позволяет судить о воз-

можной зависимости концентрации газа, при которой удастся согласовать модельные и измеренные значения оптической толщины, от кинетической температуры газа, приведенной в табл. 3. Другие варианты — это более низкая кинетическая температура газа в областях излучения NH_2D , либо низкий фактор заполнения диаграммы направленности антенны. Эти варианты были рассмотрены и отброшены выше. Таким образом, оценки оптической толщины, скорее всего, указывают на довольно низкую концентрацию газа в тех областях, где эта оптическая толщина значительна. Надо, однако, учитывать тот факт, что моделирование в RADEX не принимает во внимание сверхтонкое расщепление перехода, как отмечено выше. Это приводит к неопределенностям в оценках. Для дальнейших оценок мы принимаем в качестве наиболее вероятного значения концентрации газа величину $n = 10^4 \text{ см}^{-3}$, которая соответствует упомянутым выше оценкам из анализа возбуждения молекул и достаточна близка к той, которая требуется для согласования измеренных и модельных значений оптической толщины в линии. Тем не менее, эта величина находится на нижней границе интервала значений концентрации, найденных из анализа возбуждения молекул. Таким образом, найденные нами в предположении $n = 10^4 \text{ см}^{-3}$ значения лучевой концентрации представляют собой, по сути, верхние пределы истинных значений.

3.3. Оценки относительного содержания NH_2D и отношения содержаний $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$

Следующим шагом исследований стали расчеты относительного содержания NH_2D , т. е. отношения количества дейтерированного аммиака NH_2D на луче зрения к количеству молекул H_2 . Для расчетов количества молекулярного водорода H_2 были использованы данные о молекулах C^{18}O , взятые из работы [43]. Относительное содержание C^{18}O принято равным 1.7×10^{-7} [44]. Таким образом, выразив из этого соотношения лучевую концентрацию молекулярного водорода H_2 , можно рассчитать относительное содержание дейтерированного аммиака NH_2D . Известно, что относительное содержание C^{18}O меняется по радиусу Галактики вследствие наличия градиента отношения распространенностей $^{16}\text{O}/^{18}\text{O}$ [45, 46]. Мы это изменение не учитываем, поскольку для источников нашей выборки с достаточно надежными оценками расстояний оно не превышает $\sim 30\%$ (галактоцентрические расстояния для них лежат в интервале от ~ 8 до ~ 11 кпк (см. табл. 1). Это значительно меньше, чем вариации, которые в дальнейшем обсуждаются. При-

Таблица 3. Лучевая концентрация молекул

Источник $n =$	NH_2D , $10^{13}, \text{см}^{-2}$ $1 \times 10^4 \text{см}^{-3}$	NH_2D $10^{13}, \text{см}^{-2}$ $1 \times 10^5 \text{см}^{-3}$	NH_2D $10^{13}, \text{см}^{-2}$ $1 \times 10^6 \text{см}^{-3}$	NH_3 $10^{14}, \text{см}^{-2}$	$\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ $10^{-2}, \text{см}^{-2}$ $1 \times 10^4 \text{см}^{-3}$	$\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ $10^{-2}, \text{см}^{-2}$ $1 \times 10^5 \text{см}^{-3}$	$\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ $10^{-2}, \text{см}^{-2}$ $1 \times 10^6 \text{см}^{-3}$	T_{kin} , К
G121.30+0.66	50.00(2.97)	4.79(28)	1.97(12)	10.00 [24]	50.00(2.97)	4.79(28)	1.97(12)	21.1 [24]; 34.4 ^a
S184	22.60(5.72)	2.21(56)	1.04(26)	7.94 [24]	28.50(7.21)	2.78(70)	1.31(33)	29 [24]; 30 ^a
S187(N_2H^+)	23.60(2.25)	2.15(20)	0.77(07)	6.48 [29]	36.50(3.47)	3.31(32)	1.18(11)	15 [24]
G133.69+1.22	<8.57	<0.83	<1.14	1.58 [24]	<54.00	<5.25	<7.20	30.7 [19]
G133.71+1.22	<20.30	<1.89	<0.84					25.1 [21]
G133.75+1.20	<9.98	<1.41	<1.49	1.58 [24]	<62.90	<8.90	<9.40	55.2 ^a
G133.95+1.07	<7.42	<0.66	<1.22	5.01 [24]	<14.80	<1.32	<2.44	18.6 ^a
S199	13.60(2.29)	1.30(22)	0.59(10)	2.47 [24]	55.10(9.28)	5.27(89)	2.38(40)	26.4 [21]
S201	<7.05	<0.67	<0.32					29.7 [21]
AFGL490	24.00(1.74)	2.29(17)	0.92(07)	20.0 [29]	12.00(87)	1.15(08)	0.46(03)	20 [24]
G142.00+1.83	<16.20	<1.46	<0.59					20 ^b
G170.66–0.27	<10.70	<0.96	<0.39					20 ^b
G174.20–0.08	<26.00	<2.59	<1.18	3.98 [24]	<65.20	<6.49	<2.95	27 [21]
G173.17+2.35	<10.60	<0.94	<0.38					20 ^b
S231	22.10(4.17)	2.11(40)	0.95(18)	7.94 [24]	27.80(5.25)	2.65(50)	1.20(23)	26.5 [24]; 40.2 ^a
G173.58+2.44	26.10(1.36)	2.43(13)	0.95(05)	8.50 [23]	30.70(1.59)	2.86(15)	1.12(06)	18.6 [24]
S235	<2.93	<0.33	<0.44	2.77 [21]	<10.60	<1.17	<1.60	40.4 ^a
G205.11–14.11	10.60(1.22)	1.21(14)	0.69(08)	2.00 [24]	53.10(6.12)	6.05(70)	3.43(40)	40.5 ^a
G189.78+0.35	17.80(2.89)	1.75(28)	0.85(14)					30.6 [21]
AFGL6366	5.32(1.67)	0.57(18)	0.31(10)	2.00 [24]	26.70(8.37)	2.85(90)	1.53(48)	37.1 ^a
S247	<1.52	<0.14	<0.40	3.16 [24]	<4.80	<0.45	<1.28	28.5 [21]
S255N	<4.81	<0.49	<0.49	4.79 [27]	<10.10	<1.03	<1.02	34.8 ^a
S255IR	<3.40	<0.35	<0.92	2.45 [27]	<13.90	<1.43	<3.75	34.5 [26]
W217	64.90(11.60)	6.49(1.16)	2.85(51)	7.94 [24]	81.70(14.60)	8.17(1.46)	3.58(64)	25 [24]; 37.1 ^a
W40	62.50(1.94)	6.65(21)	2.69(08)					20 ^b
G58.47+0.43	23.40(5.17)	2.14(47)	0.86(19)					20 ^b
S100	<47.60	<4.28	<1.72					20 ^b
G65.78–2.61	47.90(15.70)	4.44(1.46)	1.78(59)					20 ^b
G69.54–0.98	47.10(10.10)	4.42(95)	1.80(39)	15.90 [24]	29.60(6.36)	2.78(60)	1.13(24)	20.8 [24]; 32.5 ^a
G77.46+1.76	78.20(3.88)	8.27(41)	3.88(19)	5.01 [24]	156.00(7.74)	16.50(82)	7.75(38)	29 ^a
G75.78–0.34	<5.29	<0.55	<0.30					36.8 ^a
G79.27+0.39	51.60(5.65)	5.00(55)	2.01(22)	20.50 [25]	25.00(2.76)	2.44(27)	0.98(11)	20 ^b
G79.34+0.33	64.60(8.67)	6.17(83)	2.18(29)	11.90 [25]	54.30(7.29)	5.19(70)	1.82(25)	14.6 [25]
W75N	16.00(4.31)	1.81(49)	1.04(28)					41.2 ^a

W75(OH) line 1	25.30(16.10)	2.54(1.62)	1.16(74)	25.10 [24]	10.10(6.42)	1.01(65)	0.46(30)	29.6 ^a
W75(OH) line 2	35.40(6.27)	3.67(0.65)	1.94(35)	25.10 [24]	14.10(2.50)	1.46(26)	0.77(14)	29.6 ^a
W75S3	59.60(76)	7.37(09)	4.23(05)	3.71 [24]	7.50(10)	0.93(01)	0.53(01)	41.6 ^a
G81.50+0.14	<11.10	<0.96	<0.30	7.60 [25]	<14.60	<1.26	<0.40	15.4 [25]
G92.67+3.07	<7.39	<0.72	<0.35					30.7 ^a
G99.98+4.17	11.00(2.98)	1.10(30)	0.55(15)	2.51 [24]	43.60(11.90)	4.37(1.19)	2.20(60)	33 ^a
S140	7.69(1.26)	0.76(13)	0.38(06)	7.94 [24]	9.68(1.59)	0.96(16)	0.48(08)	32.6 ^a
G109.87+2.11	<11.10	<1.01	<1.32	18.80 [30]	<5.90	<0.53	<0.70	20 ^b
G108.76–0.95	46.60(3.62)	4.31(34)	1.62(13)	12.60 [24]	36.90(2.87)	3.42(27)	1.28(10)	17 [24]
S153	62.50(17.10)	5.88(1.61)	2.18(60)					16.4 [23]
S152(OH)	91.50(5.48)	9.02(54)	3.35(20)	15.90 [24]	57.50(3.45)	5.67(34)	2.11(13)	16.4 [24]; 31.4 ^a
S156	<8.01	<0.73	<0.34	3.98 [24]	<20.10	<1.84	<0.85	18.8 [23]
G111.54+0.78	3.62(1.02)	0.45(13)	0.28(08)	4.32 [30]	8.37(2.37)	1.03(29)	0.65(18)	47.7 ^a
S158	23.10(6.57)	2.54(72)	1.42(40)	1.00 [24]	231.00(65.7)	25.40(7.22)	14.2(4.03)	39.3 ^a

Примечание. ^a — температуры, полученные по вращательным диаграммам молекул CH₃CCH; ^b — принятое значение.

мерно для 20% источников расстояния не известны. В некоторых случаях мы рассчитали кинематические расстояния (отмечены в табл. 1). Однако в направлениях центра и антицентра Галактики, а также в тангенциальных направлениях кинематические расстояния имеют очень большие погрешности и их использование не представляется возможным.

Для определения степени обогащения дейтерием для молекулы однократно дейтерированного аммиака NH₂D необходимо знать лучевые концентрации молекул аммиака NH₃. Значения количества молекул на луче зрения для аммиака NH₃ брались из публикаций [21, 23, 24, 25, 27, 30, 47]. Для нескольких источников брались данные наблюдений линий аммиака NH₃ из работы [29] и лучевые концентрации для них рассчитывались по формулам, представленным в публикации [47].

3.4. Анализ зависимостей относительного содержания NH₂D, NH₃ и отношения содержаний NH₂D/NH₃ от температуры и дисперсии скоростей

Далее мы провели анализ зависимостей полученных оценок относительного содержания NH₂D и отношения содержаний NH₂D/NH₃ как с учетом, так и без учета верхних пределов этих величин от температуры и от ширины линий в источнике.

Наличие корреляции с учетом пределов определялось по методу Кендалла [48], а коэффициенты линейной регрессии (коэффициенты наклона) опре-

делялись с помощью метода Бакли-Джеймса [48]. Все расчеты этих параметров выполнялись в программе ASURV. Без учета пределов помимо ранговой корреляции Кендалла, рассчитывался также коэффициент корреляции и показатель значимости по Пирсону. Критерием наличия корреляции был принят показатель значимости $p < \alpha$, где α — это порог уровня значимости, заданный равным 0.05, что означает допустимую вероятность ошибки первого рода не более 5%. В табл. 4 приведены полученные значения уровней значимости для всех зависимостей, рассмотренных в данной работе, как с учетом пределов, так и без их учета. А также в табл. 4 приведены значения коэффициентов линейной регрессии для всех рассмотренных случаев. При определении уровней значимости и коэффициентов линейной регрессии были исключены источники, для которых не были известны кинетические температуры.

Графики зависимостей относительного содержания NH₂D от кинетической температуры газа и от ширины линий в источнике приведены на рис. 4, 5. Для верхних пределов относительного содержания, как отмечено выше, использовались средние ширины других узких линий в источнике (HC₃N, H₂CO и H¹³CN). Для зависимости относительного содержания однократно дейтерированного аммиака от кинетической температуры источника, представленной на рис. 4, обнаружена статистически значимая корреляция. На этом рисунке приведены оценки

Таблица 4. Показатели значимости корреляций и коэффициенты наклона линейной регрессии

Зависимость	Показатель значимости (p)			Коэффициент наклона линейной регрессии	
	с учетом пределов	без учета пределов		с учетом пределов	без учета пределов
		(Кендалл)	(Пирсон)		
$N(\text{NH}_2\text{D})/N(\text{H}_2) \quad T_k, n = 10^4 \text{ см}^{-3}$	0.073	0.061	0.029	-0.036 ± 0.012	-0.029 ± 0.012
$N(\text{NH}_2\text{D})/N(\text{H}_2) \quad T_k, n = 10^5 \text{ см}^{-3}$	0.097	0.099	0.053	-0.032 ± 0.012	-0.025 ± 0.012
$N(\text{NH}_2\text{D})/N(\text{H}_2) \quad \Delta V, n = 10^4 \text{ см}^{-3}$	0.014	0.509	0.149	-0.397 ± 0.159	-0.235 ± 0.152
$N(\text{NH}_2\text{D})/N(\text{H}_2) \quad \Delta V, n = 10^5 \text{ см}^{-3}$	0.010	0.378	0.182	-0.399 ± 0.159	-0.212 ± 0.149
$N(\text{NH}_2\text{D})/N(\text{NH}_3) \quad T_k, n = 10^4 \text{ см}^{-3}$	0.204	0.194	0.254	-0.010 ± 0.009	-0.010 ± 0.009
$N(\text{NH}_2\text{D})/N(\text{NH}_3) \quad T_k, n = 10^5 \text{ см}^{-3}$	0.417	0.427	0.444	-0.007 ± 0.009	-0.007 ± 0.009
$N(\text{NH}_2\text{D})/N(\text{NH}_3) \quad \Delta V, n = 10^4 \text{ см}^{-3}$	0.076	0.932	0.517	-0.122 ± 0.107	0.065 ± 0.098
$N(\text{NH}_2\text{D})/N(\text{NH}_3) \quad \Delta V, n = 10^5 \text{ см}^{-3}$	0.062	0.842	0.418	-0.118 ± 0.106	0.080 ± 0.096
$N(\text{NH}_3)/N(\text{H}_2) \quad T_k$	—	0.283	0.249	—	-0.014 ± 0.012
$N(\text{NH}_3)/N(\text{H}_2) \quad \Delta V$	—	0.029	0.008	—	-0.263 ± 0.089

относительного содержания молекул однократно дейтерированного аммиака NH_2D в зависимости от кинетической температуры источника для концентрации газа равной $1 \times 10^4 \text{ см}^{-3}$. На рис. 4 красными кружками показаны полученные оценки, а синими треугольниками — значения, при расчетах которых были использованы пределы обнаружения молекул однократно дейтерированного аммиака NH_2D .

Рис. 4 показывает, что относительное содержание однократно дейтерированного аммиака NH_2D падает с ростом кинетической температуры источника. Показатель значимости для этой зависимости с учетом пределов составляет $p = 0.073$, что несколько превышает принятый порог уровня значимости. Сплошная линия на рис. 4 — это прямая линейной регрессии с учетом пределов. Так же был проведен

Рис. 4. Зависимость относительного содержания однократно дейтерированного аммиака NH_2D от кинетической температуры источника для плотности газа $n = 10^4 \text{ см}^{-3}$. Кружки — измеренные значения, треугольники — пределы обнаружения NH_2D . Сплошная линия — прямая линейной регрессии с учетом пределов, штриховая — прямая линейной регрессии без учета пределов.

Рис. 5. Зависимость относительного содержания однократно дейтерированного аммиака NH_2D от ширины линии для плотности газа $n = 10^4 \text{ см}^{-3}$. Кружки — измеренные значения, треугольники — пределы обнаружения NH_2D . Сплошная линия — прямая линейной регрессии с учетом пределов.

Рис. 6. Зависимость отношения лучевых концентраций однократно дейтерированного аммиака NH_2D и недейтерированной фракции NH_3 от кинетической температуры источника для плотности газа $n = 10^4 \text{ см}^{-3}$. Кружки — измеренные значения, треугольники — пределы обнаружения NH_2D . Кривая показывает модельную зависимость отношения $N(\text{NH}_2\text{D})/N(\text{NH}_3)$ от кинетической температуры источника T_{kin} согласно работе [2].

анализ зависимости относительного содержания однократно дейтерированного аммиака NH_2D от кинетической температуры источника без учета пределов обнаружения данной молекулы. Уровень значимости по Пирсону в этом случае составляет $p = 0.029$, что меньше принятого порога уровня значимости. Штриховая линия на рис. 4 — это прямая линейной регрессии без учета пределов.

На рис. 4 показана зависимость относительного содержания молекул однократно дейтерированного аммиака NH_2D от ширины линий в источнике для случая, когда концентрация газа принята равной 10^4 см^{-3} . Ширины линий NH_2D во всех наблюдавшихся источниках, кроме одного, находятся в диапазоне от 0.5 км/с до 4 км/с. Показатель значимости для данного соотношения равен 0.014, что ниже принятого порога уровня значимости. Здесь сплошная линия — это прямая линейной регрессии с учетом пределов. Уровень значимости по Пирсону для данной зависимости без учета пределов составляет $p = 0.149$, что существенно превышает принятый порог уровня значимости.

На рис. 6 показана зависимость отношения лучевых концентраций NH_2D и NH_3 от кинетической температуры источника для предполагаемой концентрации газа 10^4 см^{-3} . Статистически значимого изменения этого отношения в рассматриваемом интервале кинетических температур 15–50 К не наблюдается. Разброс этого отношения в исследуемых

Рис. 7. Зависимость отношения лучевых концентраций однократно дейтерированного аммиака NH_2D и недейтерированной фракции NH_3 от ширины линии для плотности газа $n = 10^4 \text{ см}^{-3}$. Кружки — измеренные значения, треугольники — пределы обнаружения NH_2D .

объектах составляет от ~ 0.08 до ~ 1.6 для предполагаемой концентрации газа 10^4 см^{-3} и от ~ 0.009 до ~ 0.25 для концентрации газа 10^5 см^{-3} . Среднее значение отношения лучевых концентраций NH_2D и NH_3 получилось равным ~ 0.5 в диапазоне температур 10–30 К для предполагаемой концентрации газа 10^4 см^{-3} . Модель же дейтерирования аммиака [2, 9] предсказывает отношение лучевых концентраций NH_2D и $\text{NH}_3 \sim 0.1$ при кинетических температурах газа 10–20 К, что ниже полученных нами значений (которые, как отмечено выше, представляют собой, по сути, верхние пределы).

Аналогичным образом была рассмотрена зависимость отношения лучевых концентраций однократно дейтерированного аммиака NH_2D и основного изотопа NH_3 от дисперсии скоростей. Данная зависимость для предполагаемой концентрации газа 10^4 см^{-3} представлена на рис. 7. Статистически значимой корреляции между этими величинами не обнаружено (табл. 4). На рис. 6 и 7 отсутствуют точки, соответствующие источникам, для которых неизвестны кинетические температуры и приняты равными 20 К.

Мы рассмотрели также зависимости относительного содержания аммиака NH_3 от кинетической температуры источника и от дисперсии скоростей. Данные зависимости представлены на рис. 8 и 9 соответственно. Относительное содержание аммиака NH_3 определялось аналогично относительному содержа-

Рис. 8. Зависимость относительного содержания аммиака NH_3 от кинетической температуры источника.

нию однократно дейтерированного аммиака NH_2D , описанному выше. На рис. 8 наблюдается тенденция к уменьшению относительного содержания аммиака NH_3 с ростом кинетической температуры газа в источниках, однако она не является статистически значимой. При этом имеется статистически значимое уменьшение относительного содержания аммиака с ростом дисперсии скоростей (рис. 9).

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наши результаты показывают отсутствие статистически значимого изменения отношения содержаний $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ в исследуемом интервале температур 15–50 К, хотя разброс оценок довольно велик (он превышает порядок величины) и некоторая тенденция к уменьшению этого отношения при температурах $T > 30$ К на рис. 6 просматривается. В то же время имеющиеся теоретические модели предсказывают сильную зависимость от температуры в этом интервале. Модель дейтерирования аммиака, представленная в работах [9, 2], предсказывает отношение $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3 \sim 0.1$ при 10–20 К и его падение до $\sim 2 \times 10^{-3}$ при 50 К. Сильная зависимость степени обогащения дейтерием от температуры предсказывается и в других моделях (см., напр., [41]). Однако существенным недостатком корреляционного анализа в данной работе является предположение об одинаковой концентрации газа во всех источниках. Это предположение, скорее всего, неверно. По некоторым оценкам имеется положительная корреляция между температурой и концентрацией газа в части этих источников [А. Г. Пазухин, частное сообщение]. Поскольку с ростом концентрации газа оценки лучевой концентрации

Рис. 9. Зависимость относительного содержания аммиака NH_3 от ширины линии. Сплошная линия — прямая линейной регрессии.

NH_2D уменьшаются, такая корреляция будет транслироваться в антикорреляцию между этими оценками и температурой, что может усилить обсуждаемые здесь тренды и обеспечить согласие с теоретической моделью.

Недавно был выполнен обзор 50-ти областей образования массивных звезд в линии пара- $\text{NH}_2\text{D } 1_{11}^a - 1_{01}^s$ на частоте 110 ГГц при помощи 300-метрового радиотелескопа Института миллиметровой радиоастрономии [49]. Линия была зарегистрирована в 36 источниках, что составляет 72% наблюдавшихся объектов. Анализ данных проводился в приближении ЛТР. Оценки степени обогащения дейтерием в этой работе получились в среднем примерно такие же, как и у нас. При этом в работе [49] найдено (на уровне 3.5σ), что отношение содержаний $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ уменьшается с ростом дисперсии скоростей в источнике, что не подтверждается нашими данными с учетом пределов обнаружения молекулы NH_2D . Также и в работе [42] такой антикорреляции не обнаружено. В этой работе ширины линий не превышают ~ 3.8 км/с.

В работе [8] найдено, что частота детектирования NH_2D в сгустках ATLASGAL понижается при температурах > 20 К. В принципе это согласуется с найденным нами уменьшением относительного содержания NH_2D с ростом температуры. Зависимости отношения $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ от температуры (в интервале 10–30 К) в работе [8], как и у нас, не обнаружено.

В работе [18], основанной на анализе карт нескольких источников, полученных на 30-метровом радиотелескопе IRAM, наблюдается заметное уменьшение отношения $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ с ростом температуры выше ~ 30 К. При этом значения этого отношения,

как и в данной работе, в несколько раз выше предсказываемого моделью [2]. Надо отметить, что объем анализируемых данных в работе [18] заметно выше, чем в данной работе.

Что касается наблюдаемой тенденции к уменьшению относительного содержания аммиака с ростом кинетической температуры газа в источниках, а также его статистически значимого уменьшения с ростом дисперсии скоростей, то стоит отметить, что в работе [27] отмечалось уменьшение относительного содержания аммиака в направлении источников с наибольшей светимостью. Температура газа вокруг источников с высокой светимостью, как и турбулентность, естественно, также повышены. При этом значения относительной концентрации NH_3 при температурах $\lesssim 30$ К близки к типичным значениям [23].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате обзора областей образования массивных звезд излучение однократно дейтерированного аммиака NH_2D зарегистрировано в 29 из 50 наблюдавшихся объектов. Анализ полученных данных, а также тот факт, что концентрация газа в исследуемых источниках по независимым оценкам значительно ниже критической концентрации для данного перехода NH_2D , указывают на не-ЛТР возбуждение NH_2D . Получены оценки лучевой концентрации NH_2D на основе не-ЛТР моделирования с использованием доступных данных о кинетической температуре газа для нескольких значений предполагаемой концентрации газа. Выявлены статистически значимые анти-корреляции между относительным содержанием NH_2D и кинетической температурой газа в интервале температур 15–50 К, а также между относительным содержанием NH_2D и дисперсией скоростей в источнике.

При этом значительного уменьшения отношения содержаний $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ с ростом температуры, предсказываемого имеющимися химическими моделями, не наблюдается (в предположении об одинаковой концентрации газа во всех источниках). Оно составляет ~ 0.5 при предполагаемой концентрации газа $n \sim 10^4$ см⁻³ в данном интервале температур, хотя разброс оценок довольно велик и эти оценки представляют собой, по сути, верхние пределы. В работе [2] предсказывается отношение $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3 \sim 0.1$ при 10–20 К и его падение до $\sim 2 \times 10^{-3}$ при 50 К. В недавно опубликованной работе [18] в диапазоне температур 10–20 К данное соотношение ~ 0.2 , однако там наблюдается спад отношения $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ при температурах > 30 К согласно мо-

дели, хотя остается выше модельных значений. Надо, однако, иметь в виду, что предположение об одинаковой концентрации газа во всех источниках, скорее всего, неверно. При наличии положительной корреляции между концентрацией газа и температурой оценки отношения $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ будут уменьшаться с ростом температуры. Таким образом, с учетом неопределенностей наших оценок лучевой концентрации результаты данной работы не противоречат химической модели в работе [2]. При этом зависимости отношения содержаний $\text{NH}_2\text{D}/\text{NH}_3$ от дисперсии скоростей не выявлено. Анализ имеющихся данных также выявил статистически значимую анти-корреляцию между относительным содержанием аммиака NH_3 и дисперсией скоростей, в то время как явной анти-корреляции между относительным содержанием аммиака NH_3 и кинетической температурой газа в источниках в диапазоне от 15 К до 50 К выявлено не было. Однако наблюдается тенденция к снижению относительного содержания аммиака NH_3 с ростом температуры газа.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена при поддержке гранта РФФ 22-22-00809.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность за поддержку со стороны Обсерватории Онсала (Швеция) в предоставлении ее оборудования и обеспечении наблюдений. Авторы благодарны анонимному рецензенту за полезные замечания, которые позволили улучшить представление результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. E. A. Trofimova, I. I. Zinchenko, P. M. Zemlyanukha, and M. Thomasson, *Astron. Rep.* 64(3), 244 (2020).
2. E. Roueff, B. Parise, and E. Herbst, *Astron. and Astrophys.* 464, 245 (2007).
3. T. Pillai, F. Wyrowski, J. Hatchell, A. G. Gibb, and M. A. Thompson, *Astron. and Astrophys.* 467, 207 (2007), arXiv:astro-ph/0702548.
4. T. Pillai, J. Kauffmann, F. Wyrowski, J. Hatchell, A. G. Gibb, and M. A. Thompson, *Astron. and Astrophys.* 530, id. A118 (2011), arXiv:1105.0004 [astro-ph.GA].
5. F. Fontani, A. Palau, P. Caselli, Á. Sánchez-Monge, et al., *Astron. and Astrophys.* 529, id. L7 (2011), arXiv:1103.5636 [astro-ph.SR].
6. O. Miettinen, M. Hennemann, and H. Linz, *Astron. and Astrophys.* 534, id. A134 (2011), arXiv:1108.5691 [astro-ph.GA].

7. *T. Gerner, Y. L. Shirley, H. Beuther, D. Semenov, H. Linz, T. Albertsson, and T. Henning*, *Astron. and Astrophys.* 579, id. A80 (2015), arXiv:1503.06594 [astro-ph.GA].
8. *M. Wielen, F. Wyrowski, C. M. Walmsley, T. Csengeri, T. Pillai, A. Giannetti, and K. M. Menten*, *Astron. and Astrophys.* 649, id/ A21 (2021), arXiv:2102.04478 [astro-ph.GA].
9. *E. Roueff, D. C. Lis, F. F. S. van der Tak, M. Gerin, and P. F. Goldsmith*, *Astron. and Astrophys.* 438(2), 585 (2005), arXiv:astro-ph/0504445.
10. *J. G. A. Wouterloot and J. Brand*, *Astron. and Astrophys. Suppl. Ser.* 80, 149 (1989).
11. *F. Daniel, L. H. Coudert, A. Punanova, J. Harju, et al.*, *Astron. and Astrophys.* 586, id. L4 (2016), arXiv:1601.00162 [astro-ph.GA].
12. *S. Tiné, E. Roueff, E. Falgarone, M. Gerin, and G. Pineau des Forêts*, *Astron. and Astrophys.* 356, 1039 (2000).
13. *L. H. Coudert and E. Roueff*, *Astron. and Astrophys.* 449(2), 855 (2006).
14. *F. F. S. van der Tak, J. H. Black, F. L. Schöier, D. J. Jansen, and E. F. van Dishoeck*, *Astron. and Astrophys.* 468, 627 (2007), arXiv:0704.0155 [astro-ph].
15. *T. Isobe and E. D. Feigelson*, *Bull. Amer. Astron. Soc.* 22, 917 (1990).
16. *M. P. Lavalley, T. Isobe, and E. D. Feigelson*, *Bull. Amer. Astron. Soc.* 24, 839 (1992).
17. *W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery*, *Numerical Recipes 3rd Edition: The Art of Scientific Computing*, 3rd Edition (Cambridge University Press, 2007), http://www.amazon.com/Numerical-Recipes-3rd-Scientific-Computing/dp/0521880688/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1280322496&sr=8-1.
18. *A. G. Pazukhin, I. I. Zinchenko, E. A. Trofimova, C. Henkel, and D. A. Semenov*, *Monthly Not. Roy. Astron. Soc.* 526(3), 3673 (2023), arXiv:2309.16510 [astro-ph.GA].
19. *S. Y. Malafeev, I. I. Zinchenko, L. E. Pirogov, and L. E. B. Johansson*, *Astron. Letters* 31, 239 (2005).
20. *L. E. Pirogov, V. M. Shul'ga, I. I. Zinchenko, P. M. Zemlyanukha, A. N. Patoka, and M. Thomasson*, *Astron. Rep.* 60, 904 (2016), arXiv:1608.08446 [astro-ph.GA].
21. *K. Schreyer, T. Henning, C. Koempe, and P. Harjunpää*, *Astron. and Astrophys.* 306, 267 (1996).
22. *L. E. Pirogov and I. I. Zinchenko*, *Astron. Rep.* 37, 484 (1993).
23. *J. Harju, C. M. Walmsley, and J. G. A. Wouterloot*, *Astron. and Astrophys. Suppl. Ser.* 98, 51 (1993).
24. *J. Jijina, P. C. Myers, and F. C. Adams*, *Astrophys. J. Suppl.* 125, 161 (1999).
25. *T. Pillai, F. Wyrowski, S. J. Carey, and K. M. Menten*, *Astron. and Astrophys.* 450, 569 (2006), arXiv:astro-ph/0601078.
26. *I. Zinchenko, P. Caselli, and L. Pirogov*, *Monthly Not. Roy. Astron. Soc.* 395, 2234 (2009), arXiv:0903.1209 [astro-ph.GA].
27. *I. Zinchenko, T. Henning, and K. Schreyer*, *Astron. and Astrophys. Suppl. Ser.* 124, 385 (1997).
28. *A. G. Pazukhin, I. I. Zinchenko, E. A. Trofimova, and C. Henkel*, *Astron. Rep.* 66(12), 1302 (2022), arXiv:2211.14063 [astro-ph.GA].
29. *J. M. Torrelles, P. T. P. Ho, J. M. Moran, L. F. Rodriguez, and J. Canto*, 307, 787 (1986).
30. *F. C. Li, Y. Xu, Y. W. Wu, J. Yang, D. R. Lu, K. M. Menten, and C. Henkel*, *Astron. J.* 152(4), id. 92 (2016), arXiv:1608.04251 [astro-ph.GA].
31. *I. I. Zinchenko, A. G. Pazukhin, E. A. Trofimova, P. M. Zemlyanukha, C. Henkel, and M. Thomasson*, *The Multifaceted Universe: Theory and Observations—2022*, held 23–27 May 2022, SAO RAS, Nizhny Arkhyz, Russia; PoS(MUTO2022), 425, id. 038 (2022) <https://pos.sissa.it/cgi-bin/reader/conf.cgi?confid=425>, id.38 .
32. *L. E. Pirogov and I. I. Zinchenko*, *Astron. Rep.* 52(12), 963 (2008), arXiv:0903.4280 [astro-ph.GA].
33. *L. Pirogov*, *Res. Astron. and Astrophys.* 18(8), id. 100 (2018), 1804.05600.
34. *Y. L. Shirley*, *Publ. Astron. Soc. Pacific* 127(949), 299 (2015), arXiv:1501.01629 [astro-ph.IM].
35. *S. Feng, P. Caselli, K. Wang, Y. Lin, H. Beuther, and O. Sipilä*, 883(2), id. 202 (2019), arXiv:1909.00209 [astro-ph.GA].
36. *S. Guilloteau and A. Baudry*, *Astron. and Astrophys.* 97(1), 213 (1981).
37. *I. I. Zinchenko and L. E. Pirogov*, *Soviet Astron.* 31, 254 (1987).
38. *J. R. Goicoechea, F. Lique, and M. G. Santa-Maria*, *Astron. and Astrophys.* 658, id. A28 (2022), arXiv:2111.03609 [astro-ph.GA].
39. *J. Stutzki and G. Winnewisser*, *Astron. and Astrophys.* 144, 13 (1985).
40. *G. Busquet, A. Palau, R. Estalella, J. M. Girart, Á. Sánchez-Monge, S. Viti, P. T. P. Ho, and Q. Zhang*, *Astron. and Astrophys.* 517, id. L6 (2010), arXiv:1006.4280 [astro-ph.GA].

41. *O. Sipilä, J. Harju, P. Caselli, and S. Schlemmer*, *Astron. and Astrophys.* 581, id. A122 (2015), arXiv:1507.02856 [astro-ph.GA].
42. *F. Fontani, G. Busquet, A. Palau, P. Caselli, Á. Sánchez-Monge, J. C. Tan, and M. Audard*, *Astron. and Astrophys.* 575, id. A87 (2015), arXiv:1410.7232 [astro-ph.SR].
43. *I. Zinchenko, C. Henkel, and R. Q. Mao*, *Astron. and Astrophys.* 361, 1079 (2000).
44. *M. A. Frerking, W. D. Langer, and R. W. Wilson*, 262, 590 (1982).
45. *T. L. Wilson and R. Rood*, *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* 32, 191 (1994).
46. *T. Liu, Y. Wu, and H. Zhang*, 775, id. L2 (2013), arXiv:1306.0046 [astro-ph.SR].
47. *M. Kohno, T. Omodaka, T. Handa, J. O. Chibueze, et al.*, *Publ. Astron. Soc. Japan* 74(3), 545 (2022), arXiv:2202.01518 [astro-ph.GA].
48. *T. Isobe, E. D. Feigelson, and P. I. Nelson*, 306, 490 (1986).
49. *Y. Li, J. Wang, J. Li, S. Liu, and Q. Luo*, *Monthly Not. Roy. Astron. Soc.* 512(4), 4934 (2022), arXiv:2204.12299 [astro-ph.GA].

A SURVEY OF HIGH MASS STAR FORMING REGIONS IN THE LINE OF SINGLY DEUTERATED AMMONIA NH₂D

E. A. Trofimova¹, I. I. Zinchenko¹, P. M. Zemlyanukha¹, M. Thomasson²

¹*Federal Research Center A. V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod, Russia*

²*Chalmers University of Technology, Onsala Space Observatory, Onsala, Sweden*

Present survey is a continuation of our research of high mass star forming regions in the lines of deuterated molecules, the first results of which were published in [1]. This paper presents the results of observations of 50 objects in the line of ortho modification of singly deuterated ammonia NH₂D $1_{11}^s - 1_{01}^a$ at frequency 85.9 GHz, carried out with the 20-m radio telescope of the Onsala Space Observatory (Sweden). This line is detected in 29 sources. The analysis of obtained data, as well as the fact that gas density in the investigated sources, according to independent estimates, is significantly lower than the critical density for this NH₂D transition, indicate non-LTE excitation of NH₂D. Based on non-LTE modeling estimates of the relative content of the NH₂D molecule and the degree of deuterium enrichment were obtained, and the dependencies of these parameters on temperature and velocity dispersion were analyzed with and without taking into account detection limits assuming the same gas density in all sources. An anticorrelation between the NH₂D relative abundances and the kinetic temperature is revealed in the temperature range 15–50 K. At the same time, significant decrease in the ratio of the NH₂D/NH₃ abundances with increasing temperature, predicted by the available chemical models, is not observed under the adopted assumptions. An anti-correlation was also revealed between the relative content of the main isotopologue of ammonia NH₃ and the velocity dispersion, while no statistically significant correlation with the kinetic temperature of sources in the same temperature range was found.

Keywords: star formation, interstellar medium, molecular clouds, interstellar molecules, radio lines